


**Результаты опроса анестезиологов-
реаниматологов (n=80),
март 2018 г.**


**«Растворы гидроксиэтилкрахмала
в вашей практике»**

Вы работаете:


- и в операционной и в палате реанимации и интенсивной терапии
- преимущественно в палате реанимации и интенсивной терапии
- преимущественно в операционной




Учреждение, в котором Вы работаете, оказывает помощь преимущественно:




Имеете ли Вы опыт использования растворов ГЭК:




Имеются ли растворы ГЭК в вашем учреждении в настоящее время:



Сталкивались ли Вы с осложнениями или с серьезными нежелательными и непредвиденными реакциями на растворы ГЭК:




Прекратили ли Вы использовать препараты ГЭК после появления письма МЗ РФ от 16 января 2017 г. №20-3/41, внесшего изменения в показания и методику применения растворов ГЭК:



Позволяет ли информация, содержащаяся в приложении к письму МЗ РФ от 16 января 2017 г. №20-3/41, и определяющая показания («лечение гиповолемии при острой кровопотере, если применение растворов кристаллоидов является недостаточным») и противопоказания («Пациенты реанимационного профиля, обычно находящиеся в отделении реанимации») к применению растворов ГЭК, принимать решение об их использовании:


● с сомнением из-за возможной ответственности за нарушение

● без колебаний




Считаете ли Вы целесообразным использовать растворы ГЭК у пациентов с кровопотерей, независимо от внесенных корректив в инструкцию:

● нет ● да




Есть ли, с Вашей точки зрения, замена препаратам ГЭК у пациентов с угрожающей жизни кровопотерей:

● да ● нет




Готовы ли Вы продолжать использовать препараты ГЭК последнего поколения в своей практике с учетом имеющихся ограничений (сепсис, ожоги, ОПН или проведение заместительной почечной терапии, продолжающееся внутричерепное или внутримозговое кровоотечение; пациенты реанимационного профиля, обычно находящиеся в отделении реанимации; гипергидратация, отек легких, дегидратация, тяжелая гипернатриемия или тяжелая гиперхлоремия, тяжелая печеночная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность, тяжелая коагулопатия; пациенты, перенесшие трансплантацию органов):




Считаете ли Вы, что противопоказания к применению являются:

● неконкретными ● четкими



Считаете ли Вы, что противопоказание, определяемое приложением к письму МЗ РФ от 16 января 2017 г. №20-3/41, «Пациенты реанимационного профиля, обычно находящиеся в отделении реанимации», идентично по своему смыслу тому, которое отражено в решении Европейского медицинского агентства – «пациенты в критическом состоянии – critical ill patients»



Продолжаются ли закупки растворов ГЭК в ваших лечебных учреждениях после внесения изменений в инструкцию по их использованию:

